



Skala Barthel – skala oceny złożonych czynności życia codziennego

Imię i nazwisko uczestnika projektu:

Adres uczestnika projektu:

Lp.	Czynność	Wynik (liczba pkt)	Punkty
1.	Spożywanie posiłków:	0 – nie jest w stanie samodzielnie jeść 5 – potrzebuje pomocy (np. przy krojeniu, smarowaniu masłem) 10 – samodzielnie, niezależnie	
2.	Przemieszczanie się (z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie):	0 – nie jest w stanie, nie zachowuje równowagi przy siedzeniu 5 – większa pomoc (fizyczna, jedna lub dwie osoby) 10 – mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna) 15 – samodzielnie	
3.	Utrzymanie higieny osobistej:	0 – potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych 5 – niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów, goleniu (z zapewnionymi pomocami)	
4.	Korzystanie z toalety (WC):	0 – zależny 5 – potrzebuje niewielkiej pomocy, ale może pewne rzeczy zrobić sam 10 – niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie	
5.	Mycie/kąpiel całego ciała:	0 – zależny 5 – niezależny (lub pod prysznicem)	
6.	Poruszanie się (po powierzchniach płaskich):	0 – nie porusza się lub dystans <50 m 5 – niezależny na wózku, wliczając zakręty >50 m 10 – spacer z pomocą (słowną lub fizyczną) jednej osoby >50 m 15 – niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski, dystans >50 m	
7.	Wchodzenie i schodzenie po schodach:	0 – zależny 5 – potrzebuje pomocy (słownej, fizycznej, przenoszenia) 10 – samodzielny	
8.	Ubieranie się i rozbieranie:	0 – zależny 5 – potrzebuje pomocy, ale może wykonać połowę czynności bez pomocy 10 – niezależny (zapinanie guzików, zamka, sznurowanie)	
9.	Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu:	0 – nie panuje nad oddawaniem stolca (lub potrzebuje lewatywy) 5 – czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)	



		10 – panuje/utrzymuje stolec	
10.	Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego:	0 – nie panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i na skutek tego niesamodzielny 5 – czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe) 10 – panuje/utrzymuje mocz	

UWAGA!!!

W kolumnie „Wynik” wpisujemy liczbę punktów za każdą z czynności, zależnie od stopnia samodzielności pacjenta.

Należy wybrać z każdej czynności jedną odpowiedź najtrafniej charakteryzującą stan osoby potrzebującej wsparcia i wpisać przypisaną jej wartość liczbową w kolumnie wynik. W wierszu suma punktów sumujemy punkty uzyskane w poszczególnych czynnościach.

Interpretacja uzyskanego wyniku:

86-100 pkt – pacjent „lekki”

21-85 pkt – pacjent „średniociężki”

0-20 pkt – pacjent „ciężki”

.....
podpis